

Informationen für Patientinnen und Patienten

Bamlanivimab 700mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Dieses Arzneimittel ist noch nicht vollständig geprüft und hat noch keine Genehmigung durch die Europäische Arzneimittelagentur oder die zuständige deutsche Bundesoberbehörde erhalten.

Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie jede auftretende Nebenwirkung melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Ende Abschnitt 4

Lesen Sie die gesamte Patienteninformation vollständig und sorgfältig durch, bevor Ihnen dieses Arzneimittels verabreicht wird, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Patienteninformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Patienteninformation angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Patienteninformation steht

1. Was ist Bamlanivimab 700mg und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Bamlanivimab 700mg beachten?
3. Wie ist Bamlanivimab 700mg anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Bamlanivimab 700mg aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Bamlanivimab 700mg und wofür wird es angewendet?

Bamlanivimab 700mg ist ein Arzneimittel, das zur Behandlung von COVID-19, der Corona-Krankheit, untersucht wird. Bamlanivimab 700mg kann möglicherweise helfen, die Virusmenge in Ihrem Körper zu begrenzen. Dies könnte Ihnen dann helfen, schneller gesund zu werden. Es liegen nur begrenzt Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit (was lässt sich mit Bamlanivimab 700mg erreichen) der Anwendung von Bamlanivimab 700mg zur Behandlung von COVID-19 vor. Gemäß den Ergebnissen einer klinischen Studie wurden Patienten nach einer Behandlung mit Bamlanivimab 700mg weniger häufig ins Krankenhaus eingeliefert oder haben eine Notaufnahme aufgesucht.

Sie können als Erwachsener oder als Kind bzw. Jugendlicher über 12 Jahren mit Bamlanivimab 700mg behandelt werden, wenn Sie nachweislich an COVID-19 (Corona) erkrankt sind, über 40 kg wiegen und

- milde bis moderate Zeichen der Erkrankung haben sowie
- Risikofaktoren für einen schweren Verlauf aufweisen.

Ihr Risiko für einen schweren Verlauf ist dann erhöht, wenn einer oder mehrere der folgenden Punkte für Sie zutreffen:

- ein Alter über 60 Jahren;
- Übergewicht;

- Herz/Kreislauf-Erkrankungen einschließlich Bluthochdruck;
- chronische Lungenerkrankungen einschließlich Asthma;
- Diabetes Typ 1 oder 2 (Zuckerkrankheit);
- chronische Nierenerkrankung mit oder ohne Dialysepflicht;
- chronische Lebererkrankungen;
- wenn Ihr Arzt meint, dass Ihr Immunsystem aufgrund einer Organtransplantation, einer Erkrankung wie Krebs oder Aids oder einer Arzneimittel-Behandlung geschwächt ist;
- bestimmte Erkrankungen des Blutes (Sichelzellanämie oder Thalassämie).

Bei Patienten, die aufgrund von COVID-19 schon im Krankenhaus behandelt wurden, wurde kein Nutzen einer Bamlanivimab-Behandlung beobachtet.

Daher sollten Sie **nicht** mit Bamlanivimab behandelt werden,

- wenn Sie wegen COVID-19 schon im Krankenhaus sind;
- wenn Sie wegen COVID-19 eine Sauerstofftherapie erhalten;
- wenn Sie wegen einer anderen Erkrankung schon eine Sauerstofftherapie erhalten und aufgrund von COVID-19 Ihr Bedarf an Sauerstoff erhöht ist.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Bamlanivimab 700mg beachten?

Bamlanivimab 700mg darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Bamlanivimab oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Sollte dies für Sie zutreffen, sprechen Sie so schnell wie möglich mit Ihrem Arzt oder dem medizinischen Fachpersonal.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Reaktionen nach der Infusion

Bamlanivimab kann allergische Reaktionen oder infusionsbedingte Reaktionen auslösen. Dazu können gehören:

- Änderungen von Blutdruck oder Puls
- Fieber
- Kurzatmigkeit, Keuchen
- Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge oder Rachen (Angioödem)
- Hautausschlag
- Übelkeit
- Erbrechen
- Schwitzen
- Zittern
- Juckreiz
- Durchfall
- Kopfschmerzen
- Muskelschmerzen

Informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt, wenn eines dieser Symptome bei Ihnen auftritt.

Kinder und Jugendliche

Bamlanivimab 700mg darf nicht an Kinder unter 12 Jahren verabreicht werden.

Anwendung von Bamlanivimab 700mg zusammen mit anderen Arzneimitteln

Sie können weiterhin Ihre üblichen Medikamente einnehmen. Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Krankenschwester, wenn Sie deshalb Fragen oder Zweifel haben.

Eine Wechselwirkung mit Covid-19 Impfungen wurde nicht untersucht und kann daher nicht ausgeschlossen werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Krankenschwester, wenn Sie schwanger sind, schwanger sein könnten oder wenn Sie stillen. Bamlanivimab wurde nicht bei schwangeren Frauen oder stillenden Müttern untersucht. Für eine Mutter und ein ungeborenes Baby kann der Nutzen von Bamlanivimab größer sein als das Risiko der Behandlung. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, besprechen Sie die Möglichkeiten und Ihre spezifische Situation mit Ihrem Arzt.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wird nicht erwartet, dass Bamlanivimab 700mg Auswirkungen auf Ihre Fähigkeit hat, am Verkehr teilzunehmen oder Maschinen zu bedienen.

3. Wie ist Bamlanivimab 700mg anzuwenden?

Bamlanivimab 700mg wird über eine einstündige intravenöse Infusion verabreicht. Sie erhalten auf diese Weise einmalig eine Dosis von 700mg Bamlanivimab.

Ihre Behandlung muss von einem erfahrenen Arzt eingeleitet und überwacht werden. Die Infusion sollte unter Bedingungen erfolgen, unter denen die sofortige Behandlung einer möglichen Infusionsreaktion oder Unverträglichkeitsreaktion (allergischen Reaktion) möglich ist.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bislang sind nicht viele Menschen mit Bamlanivimab behandelt worden. Es ist nicht auszuschließen, dass schwerwiegende und unerwartete Nebenwirkungen auftreten können.

Die Nebenwirkungen jeder intravenösen Infusion, d.h. die Verabreichung eines Arzneimittels über die Vene, können ein kurzer Injektionsschmerz, Blutungen, blaue Flecken, Schmerzen, Schwellungen und mögliche Infektionen an der Infusionsstelle sein. Dies kann auch bei der intravenösen Infusion von Bamlanivimab 700mg passieren.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Patienteninformation angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel

Paul-Ehrlich-Institut

Paul-Ehrlich-Str. 51-59

63225 Langen

Tel: +49 6103 77 8181

E-Mail: CoV2MAB@pei.de

Fax: +49 6103 77 1263

Website: www.pei.de

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels gesammelt werden können.

5. Wie ist Bamlanivimab 700mg aufzubewahren?

Vor Gebrauch wird Bamlanivimab 700mg durch Ihren Arzt oder Apotheker in einem Kühlschrank aufbewahrt.

Nach dem Verdünnen sollte Bamlanivimab sofort angewendet werden. Bei Bedarf können Infusionsbeutel mit verdünnter Lösung bis zu 14 Stunden bei Raumtemperatur (unter 30°C) oder bis zu 48 Stunden im Kühlschrank (2°C bis 8°C) gelagert werden.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Bamlanivimab 700mg enthält

- Der Wirkstoff ist: Bamlanivimab. Jede Durchstechflasche enthält 700mg.
- Die sonstigen Bestandteile sind: L-Histidin, L-Histidinhydrochlorid-Monohydrat, Natriumchlorid, Sucrose, Polysorbat 80, Wasser für Injektionszwecke

Wie Bamlanivimab 700mg aussieht und Inhalt der Packung

Bamlanivimab 700mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung ist eine klare bis leicht opaleszierende und farblose bis leicht gelblich oder bräunliche konzentrierte wässrige Lösung, die vor der Verabreichung durch intravenöse Infusion in Kochsalzlösung verdünnt wird. Bamlanivimab 700mg ist verfügbar in einer Einweg-Durchstechflasche aus Klarglas.

Eine Packung enthält 1 Durchstechflasche.

Hersteller

Lilly Corporate Centre, Indianapolis, IN 46285, USA

Eli Lilly European Clinical Trial Services SA, Site Axis Parc-Rue E. Francqui 3, Mont-Saint-Gubert, 1435, Belgium

Diese Patienteninformation wurde zuletzt überarbeitet im Dez. 2020

Falls Sie weitere Informationen über das Arzneimittel wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter in Verbindung:

Medizinische Information der Lilly Deutschland GmbH

Internet: www.lillymedical.de/de-de

Telefon: 06172 / 273 2222