



Zubereitungsanleitung Casirivimab und Imdevimab (Stand 04/2021)

Hinweise zur Zwischenlagerung

Casirivimab 1332mg und Imdevimab 1332mg Durchstechflaschen

- Durchstechflaschen sind bis zum Gebrauch im Kühlschrank bei 2°C bis 8°C zu lagern.
- Durchstechflaschen im Umkarton aufbewahren, um das Arzneimittel vor Licht zu schützen.
- Das Arzneimittel darf NICHT EINFRIEREN und NICHT GESCHÜTTELT werden.

Die Casirivimab und Imdevimab -Durchstechflaschen sollten **vor der Zubereitung** aus dem Kühlschrank entnommen und etwa **20 Minuten auf Raumtemperatur** gebracht werden (nicht direkter Hitze aussetzen!). Die zubereitete Infusion ist unmittelbar anzuwenden und darf nicht gelagert werden.

Bitte vollständig ausfüllen – dient als Herstellungsdocumentation!

Name Patient:	
Verwendetes Fertigarzneimittel:	Casirivimab 1332mg pro 11ml (120mg/ml) und Imdevimab 1332mg pro 11ml (120mg/ml) Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung mit je 1200mg Casirivimab und Imdevimab
Chargenbezeichnung:	
Zubereitungsdatum und Uhrzeit:	
Zubereitender (Name, Unterschrift):	
Verabreichungsdatum und Uhrzeit:	
Verordnender / freigebender Arzt (Name, Unterschrift):	
Anmerkung	Bitte machen Sie sich vor der Zubereitung mit der Fachinformation von Casirivimab und Imdevimab vertraut

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Herstellung sorgfältig durch!

Material-Set mit:

1x Casirivimab 1332mg (120mg/ml)

1x Imdevimab 1332mg (120mg/ml)

2x Spritze 10ml

2x Kanüle gelb (20G)

1x Infusionsbesteck

1x Inline-Filter 0,2µm

Zusätzlich benötigt wird:

250-ml-NaCl-Lösung 0,9%



Hinweise zur Zubereitung

Allgemeine Grundsätze zur aseptischen Herstellung müssen eingehalten werden

1. Prüfen Sie die Ampullen visuell auf Partikel und Verfärbungen. Die Lösung ist klar bis leicht opaleszent und farblos bis blassgelb.
2. Fläschchen vorsichtig per Hand schwenken. **Nicht schütteln!**
3. Desinfizieren Sie den Gummistopfen der Vials (Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten!).
4. Ziehen Sie mit zwei separaten Spritzen jeweils 10ml Casirivimab und 10ml Imdevimab auf (**Cave: Druckausgleich! Schaumbildung vermeiden!**) und spritzen beides langsam in die 250ml-NaCl-0,9%-Infusion.
5. Wenden Sie den Beutel/die Flasche vorsichtig zum Mischen. **Nicht schütteln!**
6. Schließen Sie das Infusionsbesteck an.
7. Verabreichen Sie die verdünnte Lösung als intravenöse Infusion über den **0,2µm-Inline-Filter** mit einer **Infusionsrate von 250ml/h** über **mind. 60 Minuten**. Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Füllschwankungen im vorbefüllten Infusionsbeutel oder -flasche u.U. nicht exakt die deklarierte Menge enthalten ist. Die Infusion sollte in jedem Fall komplett durchlaufen.
8. Spülen Sie anschließend die Infusionsleitung mit mind. 25-50ml NaCl 0,9% um zu verhindern, dass relevante Wirkstoffmengen in der Infusionsleitung verbleiben.

gemäß SPC Casirivimab und Imdevimab: Stand Januar 2021